

مبطلوبم ادا شده - کدرت گزیند

اگر انکس بد بشود سرانم خرمم در آن بوسم آن بلم را نسودد کرد ولی مولا اکل است

من بر ما و دادم جزو جادرد که من کردانه وضع سوت خون انا ده کس شده است . از او پس

نگار بر خاله طوی سحرانی نامه دمی به ادرین لایق نوشت ادر به ادر مصفا خواهم داد - چون یک ادرین

ادریس ادر کس است اگر توانستم بدانی کم ولی مولا کس می داد -

چون ادر این که من ادم کردی مملی ادر من کس که تا حیاتی سر منزل کس براید - منم کس غلامه چون

راه انجاست در نهایت احتیاج تمیز دارم - بر وقت ادر به الله کس خواهم کرد - کس از مملی کرد

دیگر وقت خود کس درین خاله ام و ادر باره اجاره دارم چون تا خود استید - منم کس با بیان کس ماری

کس تا در باره خانه خودتان من غیر گفتید کس با منی منم کس در اولت کس که با منظر ادر از آن گفته

که در لطف شعوره است آن دوره - هر حال ابرار در نظر داشته مایس - در این نامه مایس چون کس

هر حال ادم هر حال در می است - در مایس کس من شود در باره قارف اول گفته ام دل کس در کس کس کس

در کس است حیرتی هم !! - آقا حضرت علامه رضا آقا خان هم هی مایس فروره احوالات و احوالات فرستم فرورد

تسکیم از تعب کار دیم ولی این هر حال دسیم کس - باید ابرار کس - بزن باید در سالی آن به ابرار

دیه نزد کس - تا تا لیال دلالت خواهد شد - اس سرور احتیاج است - تا خودت به کس مایس

نامه ادر کس در صلب سنج نوشته شده مربوط به کس است - کس آن در بها کس باید ابرار کس

دیه تا ماریس فرورد عمره ده خلاصه تعیین کرد - به تا تا مایس کس دار کتاب ترجمه ماجرای شو بول

را کس - غلامن نزد هر جان کس - همه سو سلام حرسند - بزن و خود می بوم - بیدار کس کس کس

انجامه من کس کس مایس در دمی دفع طوری شود که ادر تواند در اینجا زدی کند - ابرار بنام نصفا ادر کس

Handwritten marginal notes on the left side of the page, including a large circular stamp or signature.

Handwritten marginal notes on the right side of the page, including a large circular stamp or signature.

۸ - ریس ۱۹۸۰
۱۸ خرداد ۱۳۵۹

بسیار ممنونم که در این باره توضیح دادید. این کارها را تا آخر هفته انجام دهید.
در مورد این بیماری باید گفت که علت آن التهاب است. این التهاب به خاطر عفونت است که در اثر سرماخوردگی یا آنفولانزا ایجاد می‌شود.
درمان آن با آنتی‌بیوتیک‌ها انجام می‌دهند. اما در صورتی که عفونت باکتریایی نباشد، آنتی‌بیوتیک‌ها بی‌فایده است.
در این مورد، اگر پزشک تشخیص دهد که عفونت باکتریایی است، آنتی‌بیوتیک مناسب را تجویز می‌کند.
در صورتی که عفونت ویروسی باشد، باید صبر کرد تا سیستم ایمنی بدن بتواند با عفونت مبارزه کند.
در این دوران، استراحت و تغذیه مناسب بسیار مهم است. همچنین مصرف مایعات فراوان نیز توصیه می‌شود.
در صورتی که علائم شدیدتر شود، باید به پزشک مراجعه کرد.
در مورد این بیماری، باید گفت که در اکثر موارد، بهبودی کامل پس از ۱۰ تا ۱۴ روز حاصل می‌شود.
در این دوران، باید از استرس اجتناب کرد و به آرامی به فعالیت‌های عادی بازگشت.
در صورتی که علائم همچنان ادامه یابد، باید به پزشک مراجعه کرد.

در این مورد، باید گفت که علت آن التهاب است. این التهاب به خاطر عفونت است که در اثر سرماخوردگی یا آنفولانزا ایجاد می‌شود.
درمان آن با آنتی‌بیوتیک‌ها انجام می‌دهند. اما در صورتی که عفونت باکتریایی نباشد، آنتی‌بیوتیک‌ها بی‌فایده است.
در این مورد، اگر پزشک تشخیص دهد که عفونت باکتریایی است، آنتی‌بیوتیک مناسب را تجویز می‌کند.
در صورتی که عفونت ویروسی باشد، باید صبر کرد تا سیستم ایمنی بدن بتواند با عفونت مبارزه کند.
در این دوران، استراحت و تغذیه مناسب بسیار مهم است. همچنین مصرف مایعات فراوان نیز توصیه می‌شود.
در صورتی که علائم شدیدتر شود، باید به پزشک مراجعه کرد.
در مورد این بیماری، باید گفت که در اکثر موارد، بهبودی کامل پس از ۱۰ تا ۱۴ روز حاصل می‌شود.
در این دوران، باید از استرس اجتناب کرد و به آرامی به فعالیت‌های عادی بازگشت.
در صورتی که علائم همچنان ادامه یابد، باید به پزشک مراجعه کرد.
در مورد این بیماری، باید گفت که در اکثر موارد، بهبودی کامل پس از ۱۰ تا ۱۴ روز حاصل می‌شود.
در این دوران، باید از استرس اجتناب کرد و به آرامی به فعالیت‌های عادی بازگشت.
در صورتی که علائم همچنان ادامه یابد، باید به پزشک مراجعه کرد.

در صورتی که علائم شدیدتر شود، باید به پزشک مراجعه کرد.
در مورد این بیماری، باید گفت که در اکثر موارد، بهبودی کامل پس از ۱۰ تا ۱۴ روز حاصل می‌شود.
در این دوران، باید از استرس اجتناب کرد و به آرامی به فعالیت‌های عادی بازگشت.
در صورتی که علائم همچنان ادامه یابد، باید به پزشک مراجعه کرد.
در مورد این بیماری، باید گفت که در اکثر موارد، بهبودی کامل پس از ۱۰ تا ۱۴ روز حاصل می‌شود.
در این دوران، باید از استرس اجتناب کرد و به آرامی به فعالیت‌های عادی بازگشت.
در صورتی که علائم همچنان ادامه یابد، باید به پزشک مراجعه کرد.